~~IV 19 S4~~
Clos 3 Rg 6 s 131-135
Inconnu Dekker

Inconnu Dekker

IV 19 S4







mi

CLOS IV RANG 19 Souche S4

DESIGNATION : Inconnu Dekker

CHARGE : Année :

Véraison : 21.7.86

Maturité : 11.8.86

X

-1

Mill. : 2 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - (P) - Dim. : 11

(L) - (M) - C

Vigueur : 3

PORT : (érig) - (1/2) érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 15

disc.-(sph).-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 6 Avec (pépins) - apyrène

s2 13 JUS : (inc.) - coloré

s3 6

s4 5

s5 5

---

Inconnu Dekker mi

CLOS IV RANG 19 Souche S4

Désignation :

CHARGE : Année :

Véraison : 21.7.87

Maturité : 10.8.87

X

-1

Mill. : 2 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - (P) - Dim. : 11

(L) - (M) - C

Vigueur : 3

PORT : (érig) - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 16

disc.-(sph).-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 16 Avec (pépins) - apyrène

s2 10 JUS : (inc.) - coloré

s3 14

s4 10

s5 10

DESIGNATION : Fruhriesling ~~0605~~ faux = Inconnu Dekker IV 19 S1
EMPLACEMENT : IV . 19 . S4

Date de la vendange : 18 - 8 - 72 (0)
Poids de la vendange : 2 kg 600
Nombre de souches : 3 0,870
Nombre de grappes : 40
Pourriture : 4
Couleur : Blanc
Indice réfract. : 27,2 16°2
Acidité du moût : 6,6
Decuvé ~~[illegible]~~ - date : 23.8.
densité : 1021

MISE EN BOUTEILLE - date : 2.9.72
densité : 992 0,85

Degré alcoolique : plus de 15°
Acidité du vin : 4,3 (5.12.72)

Date de Dégustation : 28.6.73

OBSERVATIONS : musqué
a du sucre.
Classe 1 - 2

---

ANNEE 1989
NOM Inconnu Dekker (~~060501~~) EMPLACEMENT IV 19 S4

mi

3 R 6 s 131. 135

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6,3 | 9,3. | 9 | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 6,3 | 8,3. | 2 | | | | | | | | 1.8 |
| 3 | 8 | 6,3 | 9,3. | 10 | 7,3 | 20,5 | 24,5 | 29.5 | 10.7 | 17.7 | 24.7 | |
| 4 | 8 | 6,3 | 9,3. | 4 | | | −3 | | | 0 | | −1 |
| 5 | 6 | 6,3 | 9,3. | 3 | | | | | | | | |
| | 38 | | | 28 | | | | | | | | |

D le 9.3.89 +11

Mill. : Pourriture : Port : mi érigé Vigueur : 3

ANNEE 1989

NOM Inconnu Dekker

EMPLACEMENT 3 R6 s 131-135

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13.3 | 16.3 × | 2 | | | 22.5 | 24.5 | 10.7 | | | |
| 2 | f | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 13.3 | 16.3 · | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 13.3 | 16.3 · | 4 | 16 | | 22.5 | 24.5 | | 14.7 | 17.7 | 30.7 |
| 5 | 3 | 13.3 | 16.3 × | 10 | | | 22.5 | 24.5 | 10.7 | -1 | | -2 |
| | | | | | | | -5 | | | | | |
| | 10 | | | 16 | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : érigé Vigueur : 2,5

D le 16.3.89 -2

ANNEE 1992

NOM

Inconnu Dekker

mi

EMPLACEMENT 3 R6 s 131-135

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.3 | 16.3 × | 7 | 21 | 20.5 | 24.5 | 27.5 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | mangé le 29.7 |
| 2 | f | | | | | | +2 | | | -1 | | |
| 3 | 2 | 13.3 | 16.3 × | 4 | | | | | | | | |
| 4 | f | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 19.3 | 23.3 · | 8 | | | | | | | | |

D le 16.3.92 -4.

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Inconnu Dekker mi

EMPLACEMENT 3R 61.131.135 IV 19 S 4

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11.3 | 16.3 x | 3 | 7 | 27.5 | 30.5 / 0 | 1-6 | 12.7 | 15.7 / -1 | 19.7 | 5.8 / -1 |
| 2 f | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 11.3 | 16.3 x | 0 | | | | | | | | |
| 4 f | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 16.3 | 18.3 x | 6 | | | | | | | | |

D le 16.3.93 -4

Grappe : (G) - M - P Dim : 9 Compacité : (L) - M - C

Pour : Mill : 1

Baie : TG - G - M - P Dim: 15

disc-(sph)-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : erigé Vigueur : 2

---

Frühriesling ~~0605~~ faux = Inconnu Dekker IV 19 S 1

| | | 76 | | 77 | | 79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véraisons à 50% | | | | | | | |
| 0605 01 IV 19 S4 | 22-7 | -1 | 18-7 | -2 | 17.7 | -2 | -1,7 |

| | 68 | 69 | 70 | |
|---|---|---|---|---|
| Fertilité taille courte | 20 | 22 | 17 | 20 |

N° d'ordre :
Désignation : Incanna Dekker
Emplacement : IV. 1954 1.1 (3 Rb s- 131-135)

= Riesling précoce Frühriesling

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.
Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.
Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure
Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.
Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.
A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.
Face supérieure
Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.
A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.
Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

Inconnu Dekker = Riesling précoce
Frühriesling
N° d'ordre : * IV 1954 s.1
Désignation : 3 R6 s. 131-135
Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.
Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

légèt colorées

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.
Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.
Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.
très courte - courte - moyenne - longue - très longue.
Bourgeon : coloré 264 légt - vert 265.

## ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.
Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre : Gucanus Dekker = Riesling précoce
Désignation : IV-1954 s.2 = Frühriesling
Emplacement : (3 R6 s 131-135)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 à - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 parfois - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - totalement.

-Calvo 90

N° d'ordre : Inconnu Dekker = Riesling précoce
Désignation : IVE 1954 A.4 Frühriesling
Emplacement : 3 R60.131.135

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 10 x ).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 15 x 15).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - assez peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

Inconnu Dekker = Riesling précoce

DENOMINATION : IV-1954 s.2

EMPLACEMENT : 3 R6 s 131.135

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......10.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) léger - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 90

N° d'ordre :

Désignation : Inconnue Dekker

Emplacement : 3 R6 1 131.135

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - 2 - (3) |
| Sexe | : 4 - 5 - (6) |
| $L_1/L$ | : (7) - 8 - 9 |
| $L_2/L$ | : 10 - (11) |
| Nombre de lobes | : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - (18) - (19) - 20 |
| Prof. sinus latéral Inf. | : 21 - (22) - (23) - 24 |
| Forme sinus pétiolaire | : 25 - 26 - 27 - (28) - (29) |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : 266 |
| Sinus pétiolaire ouvert | : 267 |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - 38 - (39) |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : (268) - en U : (269) - autre : (270) |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : (271) |
| Dents : forme | : (40) - 41 |
| Dents (angle) | : (42) - (43) - 44 |
| Angle du lobe terminal | : 45 - 46 - (47) |
| Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - (49) - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58 - 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : (60) - (61) - (62) |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - 64 - 65 - (66) - (67) |

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92.